

Fontane

| | |
|-------------------|---|
| Kreuzung: | Agria x AR 76-034-03 |
| Züchter: | Svalöf-Weibull/Agrico, Emmeloord |
| Reifezeit: | mittelfrüh |
| Knollen: | ovale bis langovale Form, gleichmäßig gelbe, glatte Schale, flache Augen gelbe Fleischfarbe |
| Ertrag: | hoch bis sehr hoch ziemlich hohe Knollenzahl regelmäßige, ziemlich grobfallende Sortierung |
| Qualität: | Kochtyp B, vorwiegend festkochend gute Speisequalität hoher Stärkegehalt sehr gute Eignung für die Herstellung von Pommes-Frites |
| Krankheiten: | resistent gegen Nematoden, Biotypen Ro1 und Ro4 ziemlich gute Resistenz gegen Krautfäule gute Resistenz gegen Knollenfäule gute Virusresistenzen |
| Weitere Merkmale: | mittlere Schorfresistenz wenig anfällig gegen Innenfehler mittlere Resistenz gegen Rodebeschädigungen gute Lagereignung |

FONTANE ist eine mittelfröhe Speisesorte mit sehr guter Eignung für die Herstellung von Pommes-Frites: eine grobfallende Sortierung, hoher Stärkegehalt, ovale bis langovale Form, sehr gute Backfarbe.

Anbauempfehlungen

| | |
|----------|--|
| Boden: | Fontane ist für alle Bodenarten geeignet (aber aufpassen mit Schorf). Fontane reagiert positiv auf Beregnung, mit der Beregnung zeitig anfangen. |
| Düngung: | Stickstoff: Grunddüngung 160-180 kg N-Soll beim Pflanzen. In Juli/August nach Bedarf bei der Phytophthora-behandlungen mit N-haltigem Dünger nachdüngen (Z.B. 6 x 10 N = insgesamt ca. 240 N). Fontane braucht eine gleichmäßige Abreife damit der Ertrag und die Qualität sichergestellt werden. |

Kalibedarf: hoher Kalibedarf, zwischen 260 und 350 kg
K₂O/ha (auch hier sind geteilte Gaben empfehlenswert)
Phosphor: normaler Bedarf, 80-120 kg/ha

| | |
|-----------------|---|
| Pflanzen: | Fontane hat eine gute Keimruhe (Agria), ein Wärmestoß ist daher zu empfehlen (keimgespitzt Pflanzen). Pflanzabstand etwas enger als Bintje aber weiter als Agria (Agria 32/33 cm, Fontane 34/36 cm, Bintje 38/40 cm). Auf normaler Tiefe ablegen, Fontane verteilt sich sehr gut im Damm und wächst nach unten. |
| Pflanzenschutz: | Fontane hat eine ziemlich gute Krautfäuleresistenz, normale Spritzabstände einhalten mit weniger systemischen Mitteln als Bintje. Bei den Behandlungen auch auf Alternaria achten. |
| Roden: | Fontane kann bei einem UWG von über 440 Gramm empfindlich sein gegen Blaufleckigkeit. Daher bei hohem UWG mit Vorsicht roden. |
| Lagerung: | Fontane hat eine gute Lagereignung und ist in der Backfarbe stabil. Bei der Einlagerung für eine relativ schnelle Abtrocknung sorgen, Lagertemperatur zwischen 7,5°C und 8,5°C je nach Partie. |

Quelle: <http://weuthen-gmbh.com/index.php/pflanzkartoffeln/126-fontane-1> Stand: 12.07.2015

Hinweis:

Trotz aller Sorgfalt die zum Zusammentragen aller Informationen dieser Empfehlung führten und in dieser eingingen, ist die Golden-Geest-Kartoffeln Erzeugergesellschaft mbH nicht verantwortlich für negative Anbauergebnisse.